

Reporte Agrometeorológico

Año XIV - No. 24


Perspectiva para el período correspondiente del 01 al 10 de septiembre de 2026

PRESENTACIÓN

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), por medio del Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO) y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), en coordinación con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), ponen a disposición el Reporte Agrometeorológico, el cual tiene como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de Honduras.

Tabla de Contenido

<i>Lluvia esperada para el período del 01 al 10 de septiembre de 2026</i>	2
<i>Comentario meteorológico</i>	2
<i>Temperaturas máximas (°C) para el período del 01 al 10 de septiembre de 2026</i>	3
<i>Temperaturas mínimas (°C) para el período del 01 al 10 de septiembre de 2026</i>	4
<i>Registro de lluvia acumulada período del 01 al 10 de septiembre de 2026</i>	4
<i>Pronóstico de evapotranspiración acumulada en 10 días</i>	5
<i>Datos meteorológicos por departamento</i>	5
<i>Departamento de Atlántida</i>	5
<i>Departamento de Colón</i>	6
<i>Departamento de Comayagua</i>	6
<i>Departamento de Copán</i>	6
<i>Departamento de Cortés</i>	6
<i>Departamento de El Paraíso</i>	7
<i>Departamento de Francisco Morazán</i>	7
<i>Departamento de Gracias a Dios</i>	7
<i>Departamento de Intibucá</i>	7
<i>Departamento de La Paz</i>	7
<i>Departamento de Lempira</i>	8
<i>Departamento de Ocotepeque</i>	8
<i>Departamento de Olancho</i>	8
<i>Departamento de Santa Bárbara</i>	9
<i>Departamento de Valle</i>	9
<i>Departamento de Yoro</i>	9
<i>Comentario Agronómico</i>	9
<i>Recomendaciones generales para la siembra de granos básicos, ciclo de postrera 2026</i>	9
<i>Hortalizas</i>	10
<i>Café</i>	10
<i>Frutales (mango, cítricos, aguacate, etc.)</i>	10
<i>Recomendaciones técnicas de producción para pequeños y medianos ganaderos</i>	11
<i>Gestión de Riesgo Agroclimático</i>	11



Lluvia esperada para el período del 01 al 10 de septiembre de 2026

Fuente: CENAOS, COPECO


Comentario meteorológico

Para el periodo comprendido entre el 1 al 10 de septiembre de 2026:

- El martes 1, se esperan condiciones mayormente secas y cálidas en el territorio nacional. Durante la tarde, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe generará precipitaciones débiles y dispersas en las regiones Oriental y sectores del Centro. Asimismo, la brisa procedente del océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias y chubascos débiles dispersos, con algunos acumulados moderados aislados, principalmente en las regiones Sur y Suroccidental.
- El miércoles 2 y jueves 3, el ingreso y desplazamiento de una onda tropical de corta amplitud, interactuando con una vaguada en altura, producirán un aumento en la nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica, en la mayor parte del país. Los mayores acumulados se esperan en las regiones Suroccidente, Centro y Oriente.
- El viernes 4 y sábado 5, la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del Océano Pacífico estará produciendo lluvias y chubascos débiles con actividad eléctrica aislada en las regiones Occidente, Suroccidente y Sur. En las demás regiones del país precipitaciones débiles y muy aisladas.
- El domingo 6, se esperan condiciones generalmente secas con un aumento de las temperaturas máximas sobre la mayor parte del país, con probabilidad media de chubascos débiles aislados en montañas del Oriente y Noroccidente.

- El lunes 7 y martes 8, el ingreso y desplazamiento de una onda tropical estará produciendo condiciones atmosféricas inestables, aumento de la nubosidad y lluvias y chubascos dispersos sobre la mayor parte del país, siendo más intensos en las regiones Oriental y Suroccidental.
- El miércoles 9 y jueves 10, el viento del Este y Noreste se fortalecerá, disminuyendo la probabilidad de formar nubes de tormenta, retornando las condiciones secas en la mayoría de las regiones, con algunos chubascos aislados en el Oriente y Norte.


Temperaturas máximas (°C) para el período del 01 al 10 de septiembre de 2026



Fuente: CENAOS, COPECO

Las temperaturas más altas podrían registrar con máximos de 32 a 38°C en los departamentos de Choluteca y Valle.


Temperaturas mínimas (°C) para el período del 01 al 10 de septiembre de 2026




Fuente: CENAOS, COPECO

Las temperaturas más bajas durante este período, se espera que pueda alcanzar de 10 a los 16°C durante las noches y madrugadas en las zonas montañosas de los departamentos de Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Yoro, Francisco Morazán y Olancho, para el resto del país las temperaturas bajas oscilarían entre los 17 y 26°C.

Registro de lluvia acumulada período del 01 al 10 de septiembre de 2026



Fuente: CENAOS, COPECO

Pronóstico de evapotranspiración acumulada en 10 días periodo del 01 al 10 de septiembre de 2026

Fuente: CENAOS, COPECO

Datos meteorológicos por departamento**Departamento de Atlántida**

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Arizona	31-40	29	22
El Porvenir	11-20	30	24
Esparta	41-60	29	24
Jutiapa	41-60	30	24
La Ceiba	31-40	31	24
La Música	41-60	29	22
San Francisco	31-40	27	20
San Juan Pueblo	41-60	31	24
Tela	11-20	30	24

Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración).

Departamento de Choluteca

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Apacilagua	06-10	34	26
Choluteca	41-60	38	26
Concepción de María	11-20	34	24
El Corpus	31-40	34	24
El Triunfo	11-20	35	26
Marcovia	11-20	35	26
Morolica	03-05	32	22
Namasigüe	31-40	35	26

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Orocuina	11-20	36	26
Pespire	11-20	34	26
San Marcos de Colón	03-05	30	22

Departamento de Colón

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Balfate	61-80	31	24
Bonito Oriental	41-60	31	26
Limón	41-60	31	26
Santa Rosa de Aguán	31-40	31	26
Sonaguera	41-60	31	26
Tocoa	31-40	31	24
Trujillo	11-20	27	22

Departamento de Comayagua

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Ajuterique	31-40	31	24
El Rosario	31-40	31	24
Humuya	21-30	31	24
La Libertad	41-60	32	24
Lamaní	31-40	31	22
Lejamaní	31-40	32	24
San Luis	31-40	32	22

Departamento de Copán

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Copán Ruinas	21-30	27	18
Cucuyagua	41-60	30	20
El Sisín (La Jigua)	61-80	31	22
Florida	41-60	29	20
La Entrada (Valle de Magdalena)	61-80	31	22
Las Pilas	41-60	31	20
Santa Rita	06-10	29	18
Santa Rosa de Copán	41-60	29	20
Valle de Corquín	41-60	29	20
Veracruz	41-60	29	20

Departamento de Cortés

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Choloma	41-60	32	24
La Lima	31-40	32	24
Omoa	31-40	33	26
San Antonio de Cortés	41-60	31	22
San Manuel	21-30	32	24
Santa Cruz de Yojoa	41-60	30	22
Villanueva	31-40	32	26

Departamento de El Paraíso

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Danlí	21-30	30	22
El Paraíso	41-60	30	20
Güinope	06-10	29	20
Manzaragua	3-5	29	20
Morocelí	21-30	31	22
Oropolí	11-20	32	22
San Lucas	00-02	29	20
Teupasenti	41-60	30	22
Valle de Jamastrán	41-60	31	24

Departamento de Francisco Morazán

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
El Porvenir	31-30	31	24
Orica	11-20	30	22
San Ignacio	21-30	31	22
Valle de Guaimaca	21-30	30	20
Valle de Talanga	21-30	30	22

Departamento de Gracias a Dios

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Brus Laguna	41-60	31	26
Puerto Lempira	41-60	31	26
Raya	41-60	31	26
Wampusirpi	61-80	31	26

Departamento de Intibucá

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Colomoncagua	41-60	31	22
Dolores	31-40	29	20
Intibucá	11-20	27	18
Jesús de Otoro	41-60	30	22
La Esperanza	11-20	27	18
San Francisco de Opalaca	31-40	27	18
San Juan	41-60	27	20
San Miguelito	41-60	27	20
Yamaranguila	11-20	27	18

Departamento de La Paz

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Aguanqueterique	21-30	31	22
Cabañas	21-30	29	20
Marcala	41-60	29	20
Puringla	31-40	29	20
Tutule	21-30	29	20

Departamento de Lempira

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Belén	41-60	29	20
Candelaria	21-30	29	20
Erandique	31-40	29	20
Gracias	41-60	30	20
Gualcince	31-40	29	20
La Campa	41-60	29	18
La Iguala	31-40	29	20
La Unión	11-20	29	20
Lepaera	21-30	29	20
Piraera	31-40	30	20
San Andrés	41-60	29	18
San Marcos de Caiquín	41-60	29	18
San Sebastián	41-60	27	14
Santa Cruz	21-30	29	18

Departamento de Ocotepeque

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Concepción	41-60	30	20
Dolores Merendón	21-30	30	18
Encarnación	41-60	27	18
La Labor	81-100	29	18
Lucerna	31-40	30	20
Mercedes	31-40	29	16
Ocotepeque	41-60	30	20
San Fernando	31-40	29	18
San Francisco del Valle	61-80	30	20
San Jorge	41-60	29	18
San Marcos de Ocotepeque	41-60	29	20
Santa Fe	41-60	29	20
Sensenti	81-100	29	20
Sinuapa	41-60	29	20

Departamento de Olancho

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Catacamas	11-20	31	22
Guayape	11-20	29	20
Juticalpa	31-40	31	22
Lepaguare	21-30	29	20
Rosario	41-60	29	20
San Esteban	11-20	29	20
Salamá	31-40	29	20

Departamento de Santa Bárbara

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Atíma	21-30	30	20
Azacualpa	41-60	31	24
Ilama	21-30	31	24
Macuelizo	41-60	31	24
Petoa	41-60	33	24
Quimistán	31-40	32	24
San Marcos	31-40	32	24
San Nicolás	61-80	32	22
Santa Rita	31-40	29	20

Departamento de Valle

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
Alianza	21-30	35	26
Aramecina	21-30	35	26
Goascorán	21-30	35	26
Langue	21-30	36	26
Nacaome	21-30	38	26
San Francisco de Coray	21-30	35	26
San Lorenzo	21-30	36	26

Departamento de Yoro

Zona	PPT (mm)	T° (°C)	
		Max	Min
El Negrito	11-20	32	24
El Progreso	11-20	32	26
Morazán	06-10	33	24
Olancho	31-40	31	24
Santa Rita	41-60	32	24
Sulaco	11-20	32	24
Victoria	11-20	33	24
Yoro	11-20	31	22

Comentario Agronómico.**Recomendaciones generales para la siembra de granos básicos, ciclo de postre 2026.**

1. No realizar la práctica de quema de parcelas antes de la siembra, para evitar la erosión del suelo, destrucción de la capa fértil y microorganismos benéficos.
2. Programar las siembras para que sean oportunas y de acuerdo a los pronósticos del clima.
3. Utilice variedades comerciales y criollas (precoces) de maíz y frijol con tolerancia a la sequía y biofortificadas que den buenos resultados en su zona.
4. Se recomienda la siembra de granos básicos como maíz, frijol y sorgo se realice mediante la práctica de cero labranzas, ya que permite conservar el suelo, mantener la humedad y mejorar la fertilidad de manera sostenible. Esta técnica, al evitar la remoción del suelo y aprovechar los residuos de cultivos anteriores, reduce la erosión, disminuye costos de producción y fortalece la resiliencia ante el cambio climático, convirtiéndose en una estrategia clave para una agricultura más productiva y sostenible.

5. Si opta por mecanizar su suelo puede tomar en cuenta en zona de valles: un pase de arado (30 cm) y uno o dos pases romplow/rastra.
6. En zonas de Laderas realizar obras de conservación de suelos para evitar la erosión (uso de barreras vivas y/o muertas).
7. Realizar pruebas de germinación a la semilla para determinar su calidad y poder evitar un alto porcentaje de resiembra.
8. Para productores con cultivos de exportación pueden considerar como cultivo de rotación híbridos comerciales de maíz, para romper el ciclo biológico de plagas.
9. Realizar la siembra del cultivo de frijol en zonas de ladera; en los valles, considere la construcción de camas para evitar problemas por exceso de lluvia.
10. Realizar monitoreo constante y Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIP) dentro del cultivo y en barreras vivas.
11. A nivel de los sistemas de autoconsumo y agricultura familiar implementar la siembra de cultivos de hortalizas y frutales para la seguridad alimentaria y nutricional de la familia, donde a la vez se obtengan ingresos por ventas de excedentes. Considere el manejo de prácticas de asocio con cultivos (milpa) como siembra de maíz en asocio con frijol, ayote, canavalia, dólicos, con el propósito de dar mayor cobertura al suelo y mantener la humedad.
12. Ser oportuno con la fertilización: Maíz híbrido/variedad: aplicar 18-46-0 o 12-24-12 y KCL al momento de la siembra. Entre los 25 a 30 días de germinado el maíz aplicar la primera fertilización de urea y entre los 40 a 50 días después de la siembra aplicar la segunda fertilización de urea; Frijol: durante la siembra u ocho días después, aplicar 18-46-0 ó 12-24-12. A los 15, 25 y 35 días después de la siembra, utilizar fertilizante foliar 20-20-20. Utilizar foliares a base de Zinc y Boro para evitar el aborto de la flor.
13. Realizar uso adecuado y efectivo de los pesticidas, utilizando las dosis correctas de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
14. Implementar sistemas de cosecha de agua y riego suplementario donde sea posible.

Hortalizas

1. Uso de camas elevadas y sistemas de drenaje
2. En zonas húmedas: fortalecer manejo preventivo contra mildiu, botritis y bacteriosis.
3. Mejorar ventilación en cultivos protegidos (invernaderos o microtúneles), para reducir humedad relativa.
4. Realizar aplicaciones foliares en horas frescas (temprano o al final de la tarde).

Café

1. Mantener cobertura vegetal para conservar la humedad del suelo.
2. Regular la sombra en rangos adecuados (30–40%) para reducir el estrés térmico.
3. Realizar fertilización en períodos con adecuada disponibilidad de humedad.
4. Fortalecer el monitoreo fitosanitario ante posibles incrementos de plagas y enfermedades.
5. Implementar prácticas de conservación de agua (zanjas de infiltración, acolchado).
6. Evitar podas severas durante períodos de déficit hídrico.
7. Promover la renovación de cafetales con variedades tolerantes a condiciones adversas.
8. Aplicar riego suplementario en sistemas que dispongan de este recurso.
9. Vigilar roya y ojo de gallo debido a humedad elevada (zonas altas).

Frutales (mango, cítricos, aguacate, etc.)

1. Control preventivo de antracnosis y otras enfermedades fungosas en zonas húmedas.
2. En zonas cálidas del sur: riego suplementario y aplicación de calcio y potasio para fortalecer tejidos y mejorar tolerancia al calor.

3. Evitar podas fuertes bajo condiciones de altas temperatura, para evitar estrés térmico.

Recomendaciones técnicas de producción para pequeños y medianos ganaderos.

1. Sembrar maíz u otros cultivos aptos para ensilaje en la primera quincena de mayo, para aprovechar la época de lluvias y mantener la reserva para alimentación del ganado.
2. Aprovechamiento del pasto para la elaboración de pacas de heno.
3. Incrementar áreas de sistema silvo pastoriles, cercas vivas de madreaje y bancos forrajeros.
4. Preparar harinas de leguminosas o incorporarlas a los ensilajes para tener mejor calidad de alimento.
5. En el caso de la zona sur buscar alternativas para controlar el estrés calórico.
6. Establecer campañas para evitar la quema de potreros.
7. Realizar adecuado manejo de las fuentes de agua y reservorios para tener disponibilidad de agua.
8. Mejorar la infraestructura de corrales y establos.
9. Establecer calendarios sanitarios para el control de plagas y enfermedades, aplicación de desparasitantes y vitaminas para mantener el ganado sano y vigoroso.
10. Realizar inspección del ganado constantemente para verificar que no anden heridas abiertas y evitar la contaminación por gusano barrenador.
11. Diseñar las gavetas de los potreros adecuadamente para llevar a cabo un pastoreo rotacional y reducir el pisoteo para un mejor aprovechamiento del pasto.
12. Descarte de animales viejos y débiles.
13. Uso de sales minerales todo el año.

Gestión de Riesgo Agroclimático

1. Dar seguimiento continuo a los boletines y avisos emitidos por CENAOS/COPECO.
2. Ajustar los calendarios agrícolas conforme a la evolución de las condiciones climáticas.
3. Implementar prácticas de cosecha de agua a nivel de finca.
4. Establecer planes de contingencia ante eventos de sequía prolongada y canícula extendida.
5. Promover la diversificación de sistemas productivos para reducir la vulnerabilidad.
6. Fomentar el acceso a mecanismos de aseguramiento agropecuario, cuando estén disponibles.